

## ☆ お詫びと訂正 ☆

本誌掲載の論文に誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。

◎第69巻第2号 p.12 (112)～p.27 (127) 掲載の「慢性腰痛症に伴う疼痛を有する患者に対するデュロキシセチン塩酸塩特定使用成績調査—最終解析結果報告—」(シオノギファーマコビジランスセンター株式会社・竹田裕美子ほか)の論文中、

・ p.15 (115) II 結果 1. 安全性解析対象症例の患者背景 20～21行目

### 【誤】

症例は24.5% (171/697例)であり、主な疼痛治療薬は、プレガバリン (41例)であった。

### 【正】

症例は58.8% (410/697例)であり、主な疼痛治療薬は、プレガバリン (97例)であった。

・ p.17 (117) 表1 安全性解析対象症例の患者背景

### 【誤】

|                           |    |     |      |
|---------------------------|----|-----|------|
| 合併症                       |    | 61  |      |
|                           | あり | 636 | 91.2 |
| 前疼痛治療薬                    | なし | 526 | 75.5 |
|                           | あり | 171 | 24.5 |
| 投与開始時NSAIDsまたはアセトアミノフェン併用 | なし | 358 | 51.4 |
|                           | あり | 339 | 48.6 |

### 【正】

|                           |    |            |             |
|---------------------------|----|------------|-------------|
| 合併症                       |    | 61         |             |
|                           | あり | 636        | 91.2        |
| 前疼痛治療薬                    | なし | <u>287</u> | <u>41.2</u> |
|                           | あり | <u>410</u> | <u>58.8</u> |
| 投与開始時NSAIDsまたはアセトアミノフェン併用 | なし | 358        | 51.4        |
|                           | あり | 339        | 48.6        |

・ p.23 (123) 表4 安全性解析対象症例の患者背景別の副作用発現率

【誤】

|                             |    |     |       |       |        |
|-----------------------------|----|-----|-------|-------|--------|
| 合併症                         |    | 61  | 13    | 21.86 | 0.2951 |
|                             | あり | 636 | 146   | 22.96 |        |
| 前疼痛治療薬                      | なし | 526 | 115   | 21.86 | 0.0096 |
|                             | あり | 171 | 44    | 25.73 |        |
| 投与開始時NSAIDsまたは<br>コキシブフェン併用 | なし | 358 | 96    | 26.82 | 0.0096 |
|                             | あり | 62  | 18.58 |       |        |

【正】

|                             |    |     |       |       |        |
|-----------------------------|----|-----|-------|-------|--------|
| 合併症                         |    | 61  | 13    | 21.86 | 0.6505 |
|                             | あり | 636 | 146   | 22.96 |        |
| 前疼痛治療薬                      | なし | 287 | 63    | 21.95 | 0.0096 |
|                             | あり | 410 | 96    | 23.41 |        |
| 投与開始時NSAIDsまたは<br>コキシブフェン併用 | なし | 358 | 96    | 26.82 | 0.0096 |
|                             | あり | 62  | 18.58 |       |        |