

訂正

Vol.55 No.11【論文】「悪性リンパ腫患者に対するリツキシマブ先行バイオ医薬品とバイオ後続品のInfusion Reaction 発現率の比較」は、掲載後に訂正がありましたのでお知らせ致します。

p.1306 表1【訂正版】

表1 新規導入群の患者背景とinfusion reaction

		先行品 (n=19)	後続品 (n=12)
年齢	中央値 (範囲)	67 (48-83)	76 (33-86)
性別	男 / 女	11 / 8	9 / 3
病理分類	DLBCL / FL / ほか	9 / 4 / 6	8 / 3 / 1
WBC (×100個/μL)	中央値 (範囲)	49 (2-249)	56 (17-85)
Hb (g/dL)	中央値 (範囲)	10.4 (6.3-14.5)	10.8 (7.7-14.4)
LDH (IU/L)	中央値 (範囲)	294 (174-955)	224 (177-893)
sIL-2R (U/mL)	中央値 (範囲)	1,255 (218-36,884)	1,547 (214-20,728)
投与日 (殺細胞性化学療法の前後)	前 / 後	8 / 11	11 / 1
infusion reaction	有 / 無	7 / 12	4 / 8

DLBCL : diffuse large B-cell lymphoma, FL : follicular lymphoma

p.1307 表3【訂正版】

表3 再導入群の患者背景とinfusion reaction

		先行品 (n=11)	後続品 (n=6)
年齢	中央値 (範囲)	55 (41-81)	64 (45-79)
性別	男 / 女	6 / 5	3 / 3
病理分類	DLBCL / FL / ほか	4 / 4 / 3	2 / 4 / 0
WBC (×100個/μL)	中央値 (範囲)	44 (13-110)	37 (24-209)
Hb (g/dL)	中央値 (範囲)	12.5 (7.4-16.2)	11.8 (9.4-12.9)
LDH (IU/L)	中央値 (範囲)	204 (130-917)	274 (169-501)
sIL-2R (U/mL)	中央値 (範囲)	543 (199-8,132)	1,329 (1,017-2,270)
投与日 (殺細胞性化学療法の前後)	前 / 後	6 / 5	3 / 3
RIT最終投与からの期間 (週)	中央値 (範囲)	94 (24-393)	74 (21-595)
infusion reaction	有 / 無	2 / 9	2 / 4